遺伝子検査因子別統計

品種	検査項目	アフェクテッド率	キャリア率	クリア率
アイリッシュ・セター	白血球粘着不全症	0.0%	0.0%	100.0%
アメリカン・コッカー・スパニエル	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
イタリアン・グレーハウンド	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
イングリッシュ・コッカー・スパニエル	進行性網膜萎縮症（PRA）	0.8%	41.4%	57.8%
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア	フォンウィルブランド病タイプⅠ(vWD1)	0.0%	0.0%	100.0%
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク	フォンウィルブランド病タイプⅠ(vWD1)	0.3%	11.2%	88.4%
	変性性脊髄症（DM）	0.8%	44.1%	55.1%
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル	変性性脊髄症（DM）	3.2%	46.3%	50.5%
キング・チャールズ・スパニエル	変性性脊髄症（DM）	0.0%	50.0%	50.0%
グレート・ピレニーズ	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
ゴールデン・レトリーバー	進行性網膜萎縮症（PRA）	0.0%	0.8%	99.2%
シー・ズー	プレカリクレイン欠乏症	0.4%	13.4%	86.2%
シェットランド・シープドッグ	プレカリクレイン欠乏症	0.0%	0.0%	100.0%
シベリアンハスキー	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
ジャック・ラッセル・テリア	消化管ポリポーシス	0.0%	0.6%	99.4%
	変性性脊髄症（DM）	0.6%	9.5%	89.9%
ダックスフンド（カニーンヘン）	進行性網膜萎縮症（PRA）	2.7%	31.4%	66.0%
ダックスフンド・ミニチュア（スムース、ロングヘア）	進行性網膜萎縮症（PRA）	2.4%	37.2%	60.5%
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
チワワ	進行性網膜萎縮症（PRA）	0.0%	1.9%	98.1%
バーニーズ・マウンテン・ドッグ	変性性脊髄症（DM）	0.0%	25.0%	75.0%
パグ	変性性脊髄症（DM）	1.9%	29.1%	69.0%
パピヨン	フォンウィルブランド病タイプⅠ(vWD1)	0.2%	8.3%	91.6%
ビーグル	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
ビション・フリーゼ	変性性脊髄症（DM）	0.0%	2.9%	97.1%
プードル(スタンダード)	フォンウィルブランド病タイプⅠ(vWD1)	0.0%	9.5%	90.5%
	進行性網膜萎縮症（PRA）	0.0%	25.0%	75.0%
	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
プードル(トイ)	フォンウィルブランド病タイプⅠ(vWD1)	0.0%	0.0%	100.0%
	進行性網膜萎縮症（PRA）	0.3%	12.2%	87.5%
	変性性脊髄症（DM）	0.1%	6.5%	93.4%
プードル(ミニチュア)	フォンウィルブランド病タイプⅠ(vWD1)	0.0%	0.0%	100.0%
	進行性網膜萎縮症（PRA）	0.0%	0.0%	100.0%
	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
フラットコーテッド・レトリーバー	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
ブリュッセル・グリフォン	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
フレンチ・ブルドッグ	変性性脊髄症（DM）	0.9%	23.9%	75.2%
ペキニーズ	プレカリクレイン欠乏症	0.0%	0.1%	99.9%
ボーダー・コリー	神経セロイドリポフスチン症（CL）	0.0%	0.0%	100.0%
	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
	捕捉好中球症候群	0.0%	30.0%	70.0%
ボストン・テリア	変性性脊髄症（DM）	0.0%	11.7%	88.3%
ポメラニアン	高尿酸尿症	0.0%	0.0%	100.0%
ボロニーズ	進行性網膜萎縮症（PRA）	0.0%	0.0%	100.0%
マルチーズ	グリコーゲン蓄積症	0.0%	0.1%	99.9%
ミニチュア・シュナウザー	第7因子欠乏症	0.0%	1.4%	98.5%
ミニチュア・ピンシャー	変性性脊髄症（DM）	0.5%	8.4%	91.1%
ヨークシャー・テリア	進行性網膜萎縮症（PRA）	0.4%	14.5%	85.1%
ラブラドール・レトリーバー	進行性網膜萎縮症（PRA）	0.0%	6.3%	93.8%
	変性性脊髄症（DM）	0.0%	0.0%	100.0%
柴	GM1ガングリオシドーシス	0.0%	0.2%	99.8%
日本スピッツ	第7因子欠乏症	0.0%	15.5%	84.5%
狆	進行性網膜萎縮症（PRA）	0.0%	55.9%	44.1%

品種	検査項目	アフェクテッド率	キャリア率	クリア率
アビシニアン	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	2.2%	37.0%	60.9%
アメリカン・カール	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	0.0%	100.0%
	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.0%	100.0%
アメリカン・ショートヘア	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.4%	99.6%
エキゾチック	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.0%	100.0%
エキゾチック・ショートヘア	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	2.1%	97.9%
エキゾチック・ロングヘア	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.0%	100.0%
サイベリアン・フォレスト・キャット	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	0.8%	99.2%
ジェネッタ	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	1.9%	98.1%
シャム	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	0.0%	100.0%
シャルトリュー	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	0.0%	100.0%
シンガプーラ	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	1.0%	16.6%	82.4%
スクーカム	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	0.0%	100.0%
スコティッシュ・フォールド	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	1.0%	99.0%
セルカーク・レックス・ロングヘア	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.0%	100.0%
ソマリ	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	18.7%	81.3%
トイガー	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	28.6%	71.4%
トンキニーズ	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	0.0%	100.0%
ノルウェージャン・フォレスト・キャット	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	2.3%	97.7%
ヒマラヤン	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	2.6%	97.4%
ブリティッシュ・ショートヘアー	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.4%	99.6%
ブリティッシュ・ロングヘア	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.0%	100.0%
ペルシャ	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.9%	99.1%
ベンガル	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	5.9%	94.1%
マンチカン	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.5%	99.5%
ミヌエット	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	1.0%	99.0%
メイン・クーン	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.1%	3.2%	96.6%
	肥大型心筋症（HCM）（A31P型）	0.1%	5.4%	94.4%
ラ・パーム	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	0.0%	100.0%
ラガマフィン	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.6%	99.4%
ラグドール	多発性嚢胞腎（PKD）	0.0%	0.0%	100.0%
	肥大型心筋症（HCM）（R820W型）	0.1%	2.6%	97.3%
ラムキン	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	0.0%	100.0%
ロシアンブルー	ピルビン酸キナーゼ欠損症（PK欠損症）	0.0%	0.4%	99.6%

※2025年2月時点当社調べ312,236件の検査結果に対してパーセントで表したものです。